

 SØRLANDET SYKEHUS				Foretaksnivå		Prosedyre	
Antibiotikaresistente bakterier - screening							Side 1 av 2
Dokumentplassering: I.1.9.5-9			Godkjent dato: 11.03.2019	Revideres innen: 11.03.2021	Sist endret: 17.06.2020	Revisjon: 1.06	

Foretaksnivå\Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Infeksjonskontrollprogram\Antibiotikaresistente bakterier
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: lagt til krav til screening for poliklinikk og psykiatri

Kriterier for screening antibiotikaresistente bakterier (ESBL, MRSA, VRE)

Pasienter som skal til dagkirurgi eller innlegges i sykehus og som de siste 12 måneder har:	MRSA	VRE	ESBL	Hurtig test MRSA?
- vært innlagt eller fått dialysebehandling ved helseinstitusjon utenfor Norden	X	X	X	Ja*
- vært innlagt eller fått dialysebehandling ved helseinstitusjon utenfor Norden OG i tillegg har diare, sår med ukontrollerbar sekresjon, mangelfull personlig hygiene, inkontinens for urin/avføring, urinkateter/stomi	X	X	X	Nei
- fått <u>omfattende</u> poliklinisk behandling utenfor Norden (f.eks. invasive inngrep, sårbehandling, tannbehandling, bruk av fremmedlegemer gjennom hud/slimhinne)	X			Ja*
- tidligere fått påvist MRSA (også mer enn 12 mnd siden) men ikke hatt tre negative prøvesett- hurtigtest dersom to prøvesett har vært negative.	X			Ja*
- arbeidet i helsetjenesten utenfor Norden	X			Ja*
- oppholdt seg i barnehjem, flyktningeleir	X			Ja*
- oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden OG har sår/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse, medisinsk utstyr gjennom hud/slimhinne (stomi, tracheostomi, SVK osv.)	X			Ja*
- bodd sammen med person som har fått påvist MRSA, ESBL eller VRE	Test aktuell mikrobe			Ja* Hvis MRSA
- vært innlagt i helseinstitusjon i Norden med pågående utbrudd av MRSA, ESBL eller VRE				
- overflyttes fra norske sykehus OG er under intensivbehandling		X	X	Ikke aktuelt
Pasienter som skal til konsultasjon i somatisk poliklinikk eller innlegges i psykiatrisk sykehus og som de siste 12 måneder har vært i risiko nevnt ovenfor testes kun for MRSA.				

Utarbeidet av: Smittevernheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlege Trine Nordstrøm	Verifisert av:	Godkjent av: Per Engstrand	Dok.nr: D42414
--	--	----------------	--------------------------------------	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		Antibiotikaresistente bakterier - screening				Side: 2
Dokument-id: I.1.9.5-9	Utarbeidet av: Smittevernheten	Fagansvarlig: Smittevernoverlege Trine Nordstrøm	Godkjent dato: 11.03.2019	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 1.06	Av: 2

Foretaksnivå\Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\Infeksjonskontrollprogram\Antibiotikaresistente bakterier

*MRSA hurtigtest kan kun brukes til pasient hvis:

- isolatkapasiteten i sykehuset er begrenset
- uavklart smittestatus hos pasient vil kunne utsette behandling og/eller medfører betydelig ulempe i behandlingsforløpet.

Rekvirering både hurtigtest og vanlig MRSA test:

Bruk mikrobiologisk remisse.

For hurtigtest: SSF og SSK avklar med mikrobiolog SSK tlf: 38073494.

Ved SSA –Man. Til fred: tlf. 37014558. Helg: 37075294

Hurtigtest er mulig i tidsrommet alle dager 08.00 – 15.30

Prøvetaking

Bruk vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium til bakteriologisk prøve.

Bruk beskyttelsesutstyr.

Ta ett prøvesett, det vil si én prøve fra hvert prøvetakingssted.

Ved MRSA prøve husk å fukte penselen med sterilt vann / saltvann.

Prøve tas fra:							
	Nese - Ytterkant i begge nesebor	Svelg	Perineum	Fæces - Synlig fæces på pinnen	Sår, hudlesjoner	Innstikk- sted, dren, etc.	Urin- dersom permanent kateter
MRSA	X	X	X		X	X	X
VRE				X			
ESBL				X			

Kryssreferanser

I.1.9.5-2	Prøvetaking - MRSA(Meticillinresistente gule stafylokokker).
I.1.9.5-3	MRSA kortversjon pasienter
I.1.9.5-4	MRSA kortversjon ansatte
I.1.9.5-5	MRSA, hurtigdiagnostikk for påvisning av MRSA
I.1.9.5-6	ESBL, VRE og multiresistente gramnegative stavbakterier. Tiltak i sykehus

Eksterne referanser